



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

پالوسکلیب

تابستان ۱۴۰۱

تنظیم و تدوین:

۱. دکتر قاسم جان بابایی
۲. دکتر مهدی شادنوش
۳. دکتر نسرین بیات
۴. دکتر صالح صندوقداران
۵. دکتر فرزانه اشرفی
۶. خانم زهرا سعیدی

با همکاری (به ترتیب حروف الفبا):

۱. دکتر زینب آبیاری
۲. دکتر علی باسی
۳. دکتر علیرضا رضوانی
۴. دکتر نازنین رهنما
۵. دکتر رهام سالک
۶. دکتر شراره سیفی
۷. دکتر محمد فرانش
۸. دکتر مونا ملک زاده
۹. دکتر لیلا مودب شعار
۱۰. دکتر سید اسداله موسوی
۱۱. دکتر ساناز بخشنده
۱۲. مرجان مستشار نظامی
۱۳. آزاده حقیقی

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و تدوین راهنماهای سلامت
دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت
دکتر سید موسی طباطبایی لطفی، دکتر ساناز بخشنده

بسمه تعالی
راهنمای تجویز داروی پالبوسیکلیب

شرایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	شرط تجویز دارو		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز دارو	کاربرد دارو	نام دارو
		کنتر اندیکاسیون	اندیکاسیون			
<p>۱- این دارو در بیماران postmenopausal در ترکیب با یکی از داروهای aromatase inhibitor (AI) استفاده می شود.</p> <p>۲- در بیماران pre- perimenopausal female در ترکیب با Gn Rh Agonist و AI استفاده می شود.</p> <p>۳- به صورت درمان تک دارویی کاربرد ندارد.</p> <p>۴- در بیماری که سابقه پیشرفت بیماری حین درمان با این دارو را داشته است، تکرار یا ادامه مصرف توصیه نمی شود.</p>	<p>۱۲۵ میلی گرم روزانه برای ۲۱ روز، در دوره های ۲۸ روزه^۳</p>	<p>* وجود حساسیت به دارو</p> <p>* بارداری و شیردهی^۱</p> <p>* در نارسایی کبدی نیاز به تنظیم دوز دارد.^۲</p>	<p>۱- در خط اول درمان بیمار کانسر پستان متاستاتیک تازه تشخیص داده شده هورمون مثبت و HER2 منفی در صورت وجود یکی از موارد زیر کاربرد دارد:</p> <p>- متاستاز احشایی بدون شواهد کریز احشایی (visceral crisis)</p> <p>- وجود متاستازهای استخوانی وسیع و علامت دار</p> <p>۲- در درمان بیمار کانسر پستان متاستاتیک هورمون مثبت و HER2 منفی در صورت وجود بیماری حساس به هورمون کاربرد دارد.</p> <p>(بیماری حساس به هورمون عبارت است از پیدایش متاستاز یک سال و یا بیشتر بعد از قطع هورمون درمانی ادجوانت)</p>	<p>* فوق تخصص خون و سرطان بالغین</p> <p>* متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی</p>	<p>بستری سرپایی بستری موقت</p>	<p>پالبوسیکلیب Palbociclib</p>

شرایط تجویز	دوز و توایر مصرف دارو	شرط تجویز دارو		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز دارو	کاربرد دارو	نام دارو
		کنتر اندیکاسیون	اندیکاسیون			
			<p>۳- در درمان بیمار کانسر پستان متاستاتیک هورمون مثبت و HER2 منفی در صورت وجود بیماری مقاوم به هورمون همراه با تغییر درمان اندوکراین کاربرد دارد.</p> <p>(بیماری مقاوم به هورمون عبارت است از پیدایش متاستاز در حین هورمون درمانی ادجوانت و یا کمتر از یک سال بعد از قطع هورمون درمانی ادجوانت)</p>			