



ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: پلاسما درمانی در کووید -۱۹

با سلام

براساس نتایج گزارش شده توسط جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان انتقال خون و مسئول کمیته کشوری پلاسما درمانی و نظر کمیته علمی کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود:

۱- پلاسما درمانی در بیماران Critical و انتوبه تاثیر اثبات شده ای در روند بهبودی و کاهش مرگ و میر ندارد و نباید تجویز نگردد.

۲- استفاده از این روش درمانی باید در قالب کارآزمایی های بالینی بوده و در صورتیکه با نظر پزشک معالج نیاز به پلاسما درمانی باشد بهتر است در ابتدای بیماری (ترجیحاً در ۷۲ ساعت اول) شروع گردد. لذا برای انجام آن هماهنگی های لازم بین مراکز سازمان انتقال خون هر استان و مراکز دانشگاهی جهت اهدای فراورده های خونی از بهبود یافته گان صورت پذیرد.

استفاده از IVIg در بیماران بستری فقط در صورت تصمیم گیری بالینی تحت نظر تیم ۳ نفره متشکل از پزشک معالج و دو نفر از همکاران فوق تخصص ریه / عفونی / داخلی یا فوق تخصص مراقبت های ویژه مجاز می باشد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان