



دستورالعمل درمانی مواجهه با COVID-19

در بیماری دیابت

با توجه به شیوع بالای بیماری دیابت و چاقی در ایران، و احتمال ابتلا بیشتر این بیماران به عفونت های مختلف تنفسی و امکان شدیدتر بودن این عفونت ها که با عدم کنترل قند خون و وجود بیماری های مزمن دیگر مانند چاقی، فشار خون بالا و بیماری های قلبی و عروقی و سایر عوارض، تشدید میگردد، در شرایط فعلی با شیوع ویروس کرونا برای این بیماران توصیه می گردد:

- بیماران سرپایی ضمن اجرای دستورالعمل کشوری مراقبت در مقابل ویروس کرونا، کنترل دقیق قند خون در خانه، رعایت رژیم غذایی، ورزش و مصرف منظم داروهای دیابت با نظر پزشک درمانگر، از مراجعه غیر اورژانس به مراکز درمانی خودداری نمایند.
- در صورت ابتلا به COVID-19 و نیاز به بستری در بیمارستان، بیماران با ریسک بالا در نظر گرفته شوند و با توجه به نیاز به اقدامات تشخیصی مختلف در سیر بیماری و تداخلات دارویی، درمان های خوراکی کنترل قند خون به داروی تزریقی انسولین زیر نظر پزشک درمانگر تغییر یابد.

تهیه و تنظیم:

دکتر فاطمه قائمی

شادی شهباز